Communes et référents

En
Haute-Savoie



Communes sans référent

Communes avec référents

Intégrez la lutte

Inscrivez vous sur :

www.frelonsasiatiques.fr/devenir-referent



Piégeage expérimental de printemps

GDSA74
POUR LA DÉFENSE DES ABEILLES

550 pièges Bee Vitale + appâts

Financés par le fond vert

Maillage organisé sur zone spécifique

Recherche de piégeurs volontaires,

Protocole:

Du 15 Mars au 15 Mai

- Suivi hebdomadaire
- Réapprovisionnement régulier en appât
- Saisie des captures et lieux

Piégeage expérimental de printemps

gdsa74@fnosad.fr 04/02/25 18:05

FRELON - MAILLAGE PIÈGES 2025

à :

FRELON ASIATIQUE 2025

Piégeage de printemps des fondatrices

Vous recevez ce mail car vous faites partie des 700 apiculteurs recensés dans les secteurs où des nids de frelons asiatiques ont été signalés en 2024.

La lutte a besoin de piégeurs pour ce printemps: 550 pièges Beevital sont à placer dans ces secteurs.

Dès réception de ce message merci de nous dire par retour de mail si vous souhaitez participer à ce piégeage de printemps.

RÉPONSE INDISPENSABLE: OUI je souhaite participer ou NON je ne souhaite pas participer

Vous serez contacté en temps voulu pour la distribution des pièges.

Pour information: la dernière distribution aura lieu le 15 mars à Arenthon le jour de l'AG du GDSA

La lutte est collective et elle commence dès le piégeage de printemps par le piégeage du plus grand nombre de fondatrices.

Nous comptons sur vous!

Ce message vous est adressé par votre GDSA ou votre section apicole.

Cordialement

ENVOYEZ UN MAIL À gdsa74@fnosad.fr

Piégeage expérimental de printemps

QUAND PIÉGER ?

A partir du moment où on a eu **5** jours à **+15°**, et pendant 8 semaines



OÙ PIÉGER ?

Dans les zones où la **pression du frelon asiatique est importante** à proximité d'anciens nids (découverts après le 1er octobre) ou des ruchers impactés.
À l'ombre, à côté d'une source de **nourriture printanière** (fleurs, arbres ou arbustes mellifères), à une hauteur d'environ **1m20**

CONSEILS
Visiter les pièges chaque s
les déplacer s'ils ne capter

QUELS APPÂTS ?

Appât sucré de type :

⅓ bière
⅓ sirop de fruits rouges
⅓ vin *(blanc ou rouge)*

CONSEILS
Partager les premières prises pour en laisser des vivants dans chaque piège

IMPORTANT
Protéger l'appât avec une grille fine pour éviter les noyades des insectes non-cible.
La diffusion dépend de la fraîcheur de l'appât.

Piégeage expérimental de printemps

QUELS PIÈGES ?

Utiliser des pièges nasses équipés d'un cône d'entrée avec une séparation entre l'appât et la partie de captures, les pièges les plus **efficaces et sélectifs** proposés dans le protocole régional.

Nom	Adaptation au piégeage de printemps	Probabilité de capture*	Sélectivité*
Bee-vital	+++	82%	25,4%
Robida, grille Neoppi	+	35%	1%
Redtrap	+	Non testé	Non testé
Jabeprod	-	15%	1,9%
Ornetin	-	22%	0,1%

*sources : Gilbert 2022, Ratinet 2023, Guihard 2024 synthétisées par « Réussir apiculture »

ATTENTION

Les pièges bouteilles ou cloches sont interdits dans le cadre du plan frelon : leur sélectivité est très mauvaise même avec des adaptations et leur impact sur l'entomofaune est trop important.

INFORMER

À l'aide d'une affichette à proximité des pièges afin de **sensibiliser le grand public et/ou d'éviter le vandalisme.** Vous pouvez y noter qui a installé les pièges, l'objectif qui est la lutte contre l'invasion du frelon asiatique, numéro de téléphone...

Piégeage expérimental de printemps

Formulaire de remonté de données de piégeage

Frelon Asiatique : Remontée des données de Piégeage de Printemps 2025

A déclarer en fin de campagne 2025 (de mi mars à mi mai maximum). La saisie des résultats étant possible jusqu'à fin juin maximum.

* Obligatoire

1. Nom et Prénom du Piégeur ou du Référent *

Entrez votre réponse

2. E-mail du Piégeur ou du Référent *

Entrez votre réponse

3. Département du Site de Piégeage *

- 01 Ain
- 03 Allier
- 07 Ardèche
- 15 Cantal
- 26 Drôme
- 38 Isère
- 42 Loire
- 43 Haute Loire
- 63 Puy de Dôme
- 69 Rhône
- 73 Savoie
- 74 Haute Savoie

Protection des ruchers

RUCHERS ECOLES

Recherche des nids

GDS des Savoie
L'action sanitaire ensemble

Méthode de localisation des nids de frelons asiatiques
Tom Vrancken (groupe des Vespawatchers), 27/01/2023
Traduction et adaptation : Johan Mailier

Méthode de triangulation usuelle

Les nids de frelons asiatiques peuvent être détectés en utilisant la méthode dite du « pot à mèche », ce dernier étant constitué d'un bocal rempli d'appât liquide, dans lequel trempe une mèche. La direction et la durée de vol des frelons qui viennent s'y servir puis retournent à leur nid donnent une bonne indication sur son emplacement.

Les frelons peuvent être distingués en les marquant de différentes couleurs de manière à mesurer les temps de vol même lorsqu'il y a plusieurs individus posés sur un pot. Le temps de vol d'un frelon doit être mesuré plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit à peu près constant. On estime à approximativement une minute la durée totale nécessaire à un frelon asiatique pour retourner à son nid, y déposer sa charge sucrée et revenir au pot à mèche lorsque celui-ci est distant de 100 mètres du nid. Ainsi, si un frelon prend 6 minutes 30 secondes pour faire l'aller-retour, le nid se trouve à environ 650 mètres du point

Comment les chercher?

- Pot à mèche / Abreuvoir
- Triangulation
- Marquage /chronométrage



Méthode de l'abreuvoir mobile

Par Philippe LECOEUR (Référent Frelons Asiatiques du GDS 74)

Recherche de nid facile, à la portée des apiculteurs . J'ai cherché à faire au plus simple d'après les dernières recherches de nids que j'ai effectuées.
J'ai utilisé des nourrisseurs qui se place dans les ruches (voir photos) : peu d'évaporation, plus facile à déplacer ; en cas de pluie l'eau ne rentre pas ou peu et le nourrisseur reste efficace pour attirer les frelons. Sirop (cassis, fraise...), bière, vin blanc. Je rajoute un peu de sirop de nourrissement ou du miel sur les bords, les frelons repartent plus vite.

Vendredi : temps : 1h30.
Beaucoup de frelons sur un rucher, il y a de fortes chances que le nid
En
cor
dé

TU automne 2023
N°136 page 66

Sa
Mê
en
préparation et peuvent venir rapidement quand on déplace les abreuvoirs ou à l'inverse si vous êtes sous le nid, pas un seul frelon ne va venir.

Lundi : temps : 0h30.
Toujours le même principe, pas de précipitation, bien regarder les directions prises par les frelons.
En voulant déplacer de 150 m un abreuvoir dans un roncier (pas d'arbre ou de piquet) je suis tombé sur le nid qui touchait presque le sol. Cette fois-ci le nid n'était pas loin.

Un truc infaillible : si des frelons partent dans la même direction mais pas tout à fait dans la même trajectoire, c'est qu'ils doivent contourner un obstacle.

Si tous les frelons ont pris la même direction et la même trajectoire **sur une longue distance**, ils vous indiquent la direction parfaite du nid.

Si plusieurs frelons ont deux directions et la même trajectoire, c'est qu'il y a deux nids. Ce qui est rare en milieu rural.

Ce n'est pas toujours aussi facile, mais c'est juste pour vous encourager à la recherche des nids, surtout quand vous avez de fortes attaques sur les ruches.
La recherche des nids et la destruction c'est ce qui a de plus efficace pour protéger nos abeilles.

Recherche des nids